

GROWER'S ALLY®

杀菌剂

预防和治疗白粉病



提高产量

使用 Grower's Ally 的杀菌剂产品, 种植更健康的大麻。有效灭杀和预防常见作物病原体, 包括白粉菌。

25(b) 豁免

零污染物

经测试证明干净, 不含任何残余溶剂, 不含合成杀虫剂, 不含重金属。已根据 FIFRA 25(b) 获得 EPA 登记豁免, 已列出 OMRI Listed® 清单, 可用于有机种植。



可用至收获日

可安全用于作物的任何生长阶段, 从无性系到开花周期, 任何问题都不在话下。备受大批量作物种植者信赖, 适用于任何作物种植设施。

优势

- 已列入 OMRI Listed® 清单
- 零 REI
- 无已报告植物毒性
- 已获 FIFRA 25(b) 豁免
- 无需穿戴个人防护装备
- 美国制造
- Bee Safe® - 对蜜蜂无害

结果

经实验室测试证明和灭杀 99% 的白粉菌

之前



第 0 天

之后



第 28 天 (打药 4 次)



成分

活性成分

- 柠檬酸 1.07%

惰性成分

- 水
- 乳糖
- 乳酸乙酯
- 山梨酸钾
- 苯甲酸钠
- 醋酸钠

作用原理

Grower's Ally 杀菌剂的柠檬酸成分会在叶子表面形成保护层,阻止病害发展。用作预防用途时,该产品的抗真菌效果能够减少细菌滋生并预防作物疾病。

使用指导

虫害预防

- 混合器,晃动浓缩液管。
- 按 1.20% 浓度或 45 mL/gal 混合比稀释浓缩液。
- 使用雾化喷雾器,向茎部和叶部(含下侧)喷洒一层薄雾。
- 覆盖作物每一处,直至药液形成滴流。
- 每 10 天喷洒一次,保持作物健康。

如用于重病治疗用途

- 发现有病症时即喷药处理。
- 混合器,晃动浓缩液管。
- 按 1.20% 浓度或 45 mL/gal 混合比稀释浓缩液。
- 使用雾化喷雾器,向茎部和叶部(含下侧)喷洒一层薄雾。
- 覆盖作物每一处,直至药液形成滴流。
- 然后等待 4 小时,之后喷洒第二次。
- 每 5 天重复喷洒一次,根据需要而定。

建议使用方法

- 户外种植作物应于清晨或傍晚喷洒。
- 如为室内或水培种植,应等待至使用后约 2-3 小时才可重新开灯和送风。
- 作物生长周期内无喷洒次数限制。

建议的混合比以及喷洒间隔



夸脱装

GROWER'S ALLY® 杀菌剂浓缩液 - 夸脱装						
使用方式	混合比	mL/Gal	混合药液 (加仑)	覆盖面积 (英亩)	覆盖面积 (平方英尺)	间隔(天)
预防	1.2%	45	20	0.2	9,000	10
灭杀	1.2%	45	20	0.2	9,000	5



加仑装

GROWER'S ALLY® 杀菌剂浓缩液 - 加仑装						
使用方式	混合比	mL/Gal	混合药液 (加仑)	覆盖面积 (英亩)	覆盖面积 (平方英尺)	间隔(天)
预防	1.2%	45	83	0.8	36,000	10
灭杀	1.2%	45	83	0.8	36,000	5

如要了解更多信息,请访问 GROWERSALLY.COM

Sarasota Green Group, LLC 声明该产品为一款仅具有最小风险的虫害防治产品,有资格依据 FIFRA 25(b) 获得 EPA 登记豁免。