

GROWER'S ALLY®

殺菌劑

治療和預防白粉病



提高產量

使用 Grower's Ally 的殺菌劑產品，種植更健康的大麻。有效滅殺和預防常見作物病原體，包括白粉菌。

25(b) 豁免

零污染物

經測試證明乾淨，不含任何殘餘溶劑，不含合成殺蟲劑，不含重金屬。已根據 FIFRA 25(b) 獲得 EPA 登記豁免，已列出 OMRI Listed® 清單，可用於有機種植。



可用至收穫日

可安全用於作物的任何生長階段，從無性系到開花週期，任何問題都不在話下。備受大批量作物種植者信賴，適用於任何作物種植設施。

優勢

- 已列入 OMRI Listed® 清單
- 已獲 FIFRA 25(b) 豁免
- 零 REI
- 無需穿戴個人防護裝備
- Bee Safe® - 對蜜蜂無害
- 無已報告植物毒性
- 美國製造

結果

經實驗室測試證明可以滅殺 99% 的白粉菌

之前



第 0 天

之後



第 28 天 (打藥 4 次)



成分

活性成分

- 檸檬酸 1.07%

惰性成分

- 水
- 乳糖
- 乳酸乙酯
- 山梨酸鉀
- 苯甲酸鈉
- 醋酸鈉

作用原理

Grower's Ally 殺菌劑的檸檬酸成分會在葉子表面形成保護層，從而抑制病菌發展。用作預防用途時，該產品的抗真菌效果能夠減少細菌滋生並預防作物疾病。

使用指導

蟲害預防

- 混合前，晃動濃縮液管。
- 按 1.20% 濃度或 45 mL/gal 混合比稀釋濃縮液。
- 使用霧化噴霧器，向莖部和葉部（含下側）噴灑一層薄霧。
- 覆蓋作物每一處，直至藥液形成滴流。
- 每 10 天噴灑一次，保持作物健康。

如用於重病治療用途

- 發現有病症時即噴藥處理。
- 混合前，晃動濃縮液管。
- 按 1.20% 濃度或 45 mL/gal 混合比稀釋濃縮液。
- 使用霧化噴霧器，向莖部和葉部（含下側）噴灑一層薄霧。
- 覆蓋作物每一處，直至藥液形成滴流。
- 然後等待 4 小時，之後噴灑第二次。
- 每 5 天重複噴灑一次，根據需要而定。

建議使用方法

- 戶外種植作物應於清晨或傍晚噴灑。
- 如為室內或水培種植，應等待至使用後約 2-3 小時才可重新開燈和送風。
- 作物生長週期內無噴灑次數限制。

建議的混合比以及噴灑間隔



夸脫裝

GROWER'S ALLY® 殺菌劑濃縮液 - 夸脫裝						
使用方式	混合比	mL/Gal	混合藥液 (加侖)	覆蓋面積 (英畝)	覆蓋面積 (平方英尺)	間隔 (天)
預防	1.2%	45	20	0.2	9,000	10
滅殺	1.2%	45	20	0.2	9,000	5



加侖裝

GROWER'S ALLY® 殺菌劑濃縮液 - 加侖裝						
使用方式	混合比	mL/Gal	混合藥液 (加侖)	覆蓋面積 (英畝)	覆蓋面積 (平方英尺)	間隔 (天)
預防	1.2%	45	83	0.8	36,000	10
滅殺	1.2%	45	83	0.8	36,000	5

如要瞭解更多，請訪問 [GROWERSALLY.COM](https://growersally.com)